

Groppelo

Vass4R12s501-505



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp453

4R12s501-505
Groppelo
0Mtp453

0Mtp453

2019

Groppelo

Grapello

Vass4R12s501-505

Date : 02/07
Personne : LP Nb feuille : 5







Formulaire de description 2/8
(floraison)

Année 2002

Code cépage : ni

Nom cépage : Gropello

Code clone

Observateur TD

Emplacement 412, 501, 505

Bourgeonnement

oiv 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte ①

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente 1 - en liseré ② - partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne ⑤ - forte 7 - très forte 9

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne ⑤ - forte 7 - très forte 9

oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible ① - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4 premières feuilles) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées ③ - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible 1 - faible ③ - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible ① - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible 1 - faible ③ - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4^e feuille) : nulle ou très faible ① - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal :

Jeunes feuilles du haut (3 premières)

Profil : étalées 1 - en gouttière ② - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible ② - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible ② - moyenne 203 - très forte 204

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible ① - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible ③ - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées ② - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1^{re} feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible ② - moyenne 224 - très forte 225

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible ② - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible ② - moyenne 218 - très forte 219.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible ① - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible ③ - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - plages bronzées ou cuivrées ② - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes ②

Formulaire de description 3/8
(floraison)

Année : 2002

Observateur : TD

Code cépage : m

Code clone

Nom cépage : gnegelo

Emplacement 4 R 12A 501-505

Rameau herbacé

oiv 006 **port** : érigé 1 - demi-érigé ③ - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9

oiv 007 **couleur face dorsale entrenœuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge ⑥

oiv 008 **couleur face ventrale entrenœuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge ⑥

oiv 009 **couleur face dorsale nœuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge ⑥

oiv 010 **couleur face ventrale nœuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge ⑥

oiv 011 **densité poils dressés nœuds** : absence ① - présence 9

oiv 012 **densité poils dressés entrenœuds** : absence ① - présence 9

oiv 013 **densité poils couchés nœuds** : nulle ou très faible ① - moyenne 5 - forte 9

oiv 014 **densité poils couchés entrenœuds** : nulle ou très faible ① - moyenne 5 - forte 9

oiv 015 **pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne ⑤ - forte 7 - très forte 9.

oiv 015* **pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons** : nulle ou très faible 1 - moyenne ② - forte ou très forte 3

oiv 016 **distribution vrilles** : discontinue (2 ou moins) ① - subcontinue ou continue (3 ou plus) 2.

oiv 017 **longueur vrilles** : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) ⑤ - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 **sexes de la fleur** : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 **niveau insertion 1^o inflorescence** : jusqu'au 4^o nœud 1 - au-delà du 4^o nœud ②

oiv 153 **nombre inflorescence/rameau** : 1 ou moins ① - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal :

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée ②

Villosité spéciale du rameau herbacé : aucune 288 et 289 - épines ou analogues 243 - poils massifs 244.

Couleur des vrilles : verte 260 - jaune ②⑥① - rouge 262 et 263.

à Raray à la base